

## Seznam vakcín proti vzteklině schválených v České republice k 31.5. 2016

Název	Léková forma	Držitel rozhodnutí o registraci	Země držitele	Indikace	Cílový druh	Revakcinace
BIOCAN DHPPi + LR	lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem	BIOVETA, A.S.	CZ	K aktivní imunizaci psů proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě, parvoviróze, parainfluenze, vzteklině a nejčastěji se vyskytujícím sérovarům leptospir ( <i>Leptospira icterohaemorrhagiae</i> , <i>Leptospira canicola</i> , <i>Leptospira grippotyphosa</i> ) od 12. týdne stáří.	Psi.	<b>Každoroční revakcinace</b>
BIOCAN LR	injekční suspenze	BIOVETA, A.S.	CZ	K aktivní imunizaci psů proti vzteklině a sérovarům leptospir obsaženým ve vakcíně.	Psi.	<b>Každoroční revakcinace</b>

Název	Léková forma	Držitel rozhodnutí o registraci	Země držitele	Indikace	Cílový druh	Revakcinace
Biocan Novel DHPPi/L4R	lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi	BIOVETA, A.S.	CZ	<p>Aktivní imunizace psů od 8-9 týdnů věku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-k prevenci mortality a klinických příznaků způsobených virem psinky</li> <li>-k prevenci mortality a klinických příznaků způsobených psím adenovirem typu 1</li> <li>-k prevenci klinických příznaků a snížení vylučování psího adenoviru typu 2</li> <li>-k prevenci klinických příznaků, leukopenie a vylučování psího parvoviru</li> <li>-k prevenci klinických příznaků (nosní a oční výtok) a snížení vylučování viru psí parainfluenzy</li> <li>-k prevenci klinických příznaků, infekce a vylučování <i>L. interrogans</i> sérová skupina Australis sérovar Bratislava močí</li> <li>-k prevenci klinických příznaků a vylučování močí a snížení infekce způsobené <i>L. interrogans</i> sérová skupina Canicola sérovar Canicola a <i>L. interrogans</i> sérová skupina Icterohaemorrhagiae sérovar Icterohaemorrhagiae</li> <li>-k prevenci klinických příznaků, snížení infekce a vylučování <i>L. kirschneri</i> sérová skupina Grippotyphosa sérovar Grippotyphosa močí</li> <li>-k prevenci mortality, klinických příznaků a infekce způsobené virem vztekliny</li> </ul>	Psi.	<p><b>Revakcinační schéma:</b>  <b>Jedna dávka přípravku Biocan Novel DHPPi/L4R se podává každé 3 roky.</b>  <b>U parainfluenzy a leptospirových složek se požaduje každoroční revakcinace, proto lze každý rok dle potřeby použít jednu dávku kompatibilní vakcíny Biocan Novel Pi/L4.</b></p>
BIOCAN R	injekční suspenze	BIOVETA, A.S.	CZ	K aktivní imunizaci cílových druhů zvířat proti vzteklině.	Psi, kočky, kožešinová zvířata, skot, koně, ovce, kozy, prasata.	<p><b>1. revakcinace po roce, další revakcinace každé 2 roky</b></p> <p>(nebo v závislosti na lokální legislativě)</p>

Název	Léková forma	Držitel rozhodnutí o registraci	Země držitele	Indikace	Cílový druh	Revakcinace
BIOFEL PCHR	injekční emulze	BIOVETA, A.S.	CZ	K aktivní imunizaci proti panleukopenii, herpesvirové a calicivirové infekci a vzteklině koček.	Kočky.	<b>Každoroční revakcinace</b>
CANIGEN DHA2PPi/LR	lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem	VIRBAC S.A.	F	Aktivní imunizace psů proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě, parvoviróze, leptospiróze, vzteklině a respiračním onemocněním způsobených virem parainfluenzy.	Psi.	<b>Každoroční revakcinace</b>
CANVAC DHPPiL+R	lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem	DYNTEC s.r.o.	CZ	K aktivní imunizaci psů proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě , parvoviróze, parainfluenze , třem typům leptospir a vzteklině.	Psi.	<b>Každoroční revakcinace</b>
CANVAC R	injekční suspenze	DYNTEC s.r.o.	CZ	Vakcína je určena k aktivní imunizaci kontinentálních masožravců, sudokopytníků a lichokopytníků proti vzteklině. Jsou to zejména psi, kočky, kožešinová zvířata, skot, ovce, kozy, prasata a koně.	Psi, kočky, kožešinová zvířata, skot, ovce, kozy, prasata a koně.	<b>Každoroční revakcinace</b>

Název	Léková forma	Držitel rozhodnutí o registraci	Země držitele	Indikace	Cílový druh	Revakcinace
DURAMUNE Plus DHPPi-L3R	lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem	Zoetis Česká republika, s.r.o.,	CZ	K aktivní imunizaci psů k prevenci úhynu a klinických příznaků způsobených virem psinky, k prevenci úhynu a klinických příznaků a snížení vylučování viru způsobené psím parvovirem, k prevenci úhynu a klinických příznaků způsobených psím adenovirem typu 1, k prevenci klinických příznaků a snížení infekcí způsobených psím adenovirem typu 2, ke snížení klinických příznaků a vylučování viru parainfluenzy psů, ke snížení klinických příznaků a infekcí způsobených <i>Leptospira interrogans</i> sérovary <i>Canicola</i> , <i>Icterhaemorrhagiae</i> a <i>Leptospira kirshneri</i> sérovar Grippotyphosa a k prevenci úhynu a infekce způsobené virem vztekliny.	Psi.	<b>Každoroční revakcinace</b>
EURICAN DHPPi2-LR	lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem	MERIAL SAS	F	Aktivní imunizace psů proti psince, hepatitidě, parvoviróze, laryngotracheitidě, parainfluenze, leptospiróze a vzteklině.	Psi.	<b>Každoroční revakcinace</b>
NOBIVAC RABIES	injekční suspenze	Intervet International B.V.	NL	K aktivní imunizaci zdravých psů, koček, skotu, ovcí, koz, lišek, fretek a koní proti vzteklině.	Psi, kočky, skot, ovce, kozy, lišky, fretky a koně.	<b>Psi kočky: revakcinace každé 3 roky</b> <b>Skot, koně: revakcinace každé 2 roky</b> <b>Fretky, ovce, kozy, lišky: každoroční revakcinace</b> (nebo v závislosti na lokální legislativě)
NOBIVAC RL	injekční suspenze	Intervet International B.V.	NL	Aktivní imunizace psů proti vzteklině a leptospiróze způsobené <i>L. interrogans</i> sérovary <i>canicola</i> a <i>icterohaemorrhagiae</i> .	Psi.	<b>Revakcinovat proti vzteklině vakcínami řady Nobivac lze po třech letech.</b>

Název	Léková forma	Držitel rozhodnutí o registraci	Země držitele	Indikace	Cílový druh	Revakcinace
QUADRICAT	lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem	MERIAL SAS	F	Aktivní imunizace proti panleukopenii koček, calicivirovým infekcím, virové rhinotracheitidě a vzteklině.	Kočky.	<b>Každoroční revakcinace</b>
RABIGEN MONO	injekční suspenze	VIRBAC S.A.	F	Aktivní imunizace psů a koček proti vzteklině.	Psi a kočky.	<b>Každoroční revakcinace</b>
RABISIN	injekční suspenze	MERIAL SAS	F	Aktivní imunizace zvířat proti vzteklině.	Psi, kočky, lasicovití, koně, skot, ovce.	<b>Psi, kočky: revakcinace 1 rok po primární vakcinaci. Poté v intervalech až 3 roky.</b> (nebo v závislosti na lokální legislativě) <b>Koně: každoroční revakcinace</b> <b>Skot, ovce: každoroční revakcinace</b>
Versiguard Rabies	injekční suspenze	Zoetis Česká republika, s.r.o.,	CZ	Pro aktivní imunizaci psů, koček, skotu, prasat, ovcí, koz, koní a fretok (12 týdnů a starších) pro prevenci infekce a mortality způsobené virem vztekliny.	Psi, kočky, skot, prasata, ovce, kozy, koně a fretky.	<b>Psi: Jedna dávka Versiguard Rabies každé 3 roky.</b> <b>Kočky, skot, prasata, ovce, kozy, koně a fretky:</b> <b>Zvířata by měla být revakcinována jednou dávkou vakcíny 1 rok po primární vakcinaci.</b> <b>Po první revakcinaci (podané 1 rok po primární vakcinaci) by měla být zvířata revakcinována každé 2 roky jednou dávkou vakcíny.</b>

Název	Léková forma	Držitel rozhodnutí o registraci	Země držitele	Indikace	Cílový druh	Revakcinace
Versican Plus DHPPI/L4R	lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi	Zoetis Belgium SA	BELGIE	<p>Aktivní imunizace psů od 8-9 týdnů věku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-k prevenci mortality a klinických příznaků způsobených virem psinky,</li> <li>-k prevenci mortality a klinických příznaků způsobených psím adenovirem typu 1,</li> <li>-k prevenci klinických příznaků a snížení vylučování psího adenoviru typu 2,</li> <li>-k prevenci mortality a klinických příznaků, leukopenie a snížení vylučování psího parvoviru</li> <li>-k prevenci klinických příznaků (nosní a oční výtok) a snížení vylučování viru psí parainfluenzy,</li> <li>-k prevenci klinických příznaků, infekce a vylučování <i>L. interrogans</i> sérová skupina Australis sérovar Bratislava močí,</li> <li>-k prevenci klinických příznaků, vylučování močí a ke snížení infekce způsobené <i>L. interrogans</i> sérová skupina Canicola sérovar Canicola a <i>L. interrogans</i> sérová skupina Icterohaemorrhagiae sérovar Icterohaemorrhagiae,</li> <li>-k prevenci klinických příznaků a ke snížení infekce a vylučování <i>L. interrogans</i> sérová skupina Grippotyphosa sérovar Grippotyphosa močí a</li> <li>-k prevenci mortality, klinických příznaků a infekce způsobené virem vztekliny.</li> </ul>	Psi.	<b>Každoroční revakcinace</b>

Název	Léková forma	Držitel rozhodnutí o registraci	Země držitele	Indikace	Cílový druh	Revakcinace
Versican Plus Pi/L4R	lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi	Zoetis Belgium SA	BELGIE	<p>Aktivní imunizace psů od 8-9 týdne věku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-k prevenci klinických příznaků (nosní a oční výtok) a snížení vylučování viru psí parainfluenzy,</li> <li>-k prevenci klinických příznaků, infekce a vylučování <i>L. interrogans</i> sérová skupina Australis sérovar Bratislava močí,</li> <li>-k prevenci klinických příznaků, vylučování močí a ke snížení infekce způsobené <i>L. interrogans</i> sérová skupina Canicola sérovar Canicola a <i>L. interrogans</i> sérová skupina Icterohaemorrhagiae sérovar Icterohaemorrhagiae,</li> <li>-k prevenci klinických příznaků a ke snížení infekce a vylučování <i>L. interrogans</i> sérová skupina Grippotyphosa sérovar Grippotyphosa močí a</li> <li>-prevence mortality, klinických příznaků a infekce virem vztekliny</li> </ul>	Psi.	<b>Každoroční revakcinace</b>