

## Seznam vakcín proti vzteklině schválených v České republice k 30. 6. 2020

Název	Léková forma	Držitel rozhodnutí o registraci	Země držitele	Indikace	Cílový druh	Revakcinace
BIOCAN DHPPi + LR	lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem	BIOVETA, A.S.	CZ	K aktivní imunizaci psů proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě, parvoviróze, parainfluenze, vzteklině a nejčastěji se vyskytujícím sérovarům leptospir ( <i>Leptospira icterohaemorrhagiae</i> , <i>Leptospira canicola</i> , <i>Leptospira grippotyphosa</i> ) od 12. týdne stáří.	Psi.	<b>Každoroční revakcinace</b>
BIOCAN LR	injekční suspenze	BIOVETA, A.S.	CZ	K aktivní imunizaci psů proti vzteklině a sérovarům leptospir obsaženým ve vakcíně.	Psi.	<b>Každoroční revakcinace</b>

Název	Léková forma	Držitel rozhodnutí o registraci	Země držitele	Indikace	Cílový druh	Revakcinace
Biocan Novel DHPPi/L4R	lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi	BIOVETA, A.S.	CZ	<p>Aktivní imunizace psů od 8-9 týdnů věku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-k prevenci mortality a klinických příznaků způsobených virem psinky</li> <li>-k prevenci mortality a klinických příznaků způsobených psím adenovirem typu 1</li> <li>-k prevenci klinických příznaků a snížení vylučování psího adenoviru typu 2</li> <li>-k prevenci klinických příznaků, leukopenie a vylučování psího parvoviru</li> <li>-k prevenci klinických příznaků (nosní a oční výtok) a snížení vylučování viru psí parainfluenzy</li> <li>-k prevenci klinických příznaků, infekce a vylučování <i>L. interrogans</i> sérová skupina Australis sérovar Bratislava močí</li> <li>-k prevenci klinických příznaků a vylučování močí a snížení infekce způsobené <i>L. interrogans</i> sérová skupina Canicola sérovar Canicola a <i>L. interrogans</i> sérová skupina Icterohaemorrhagiae sérovar Icterohaemorrhagiae</li> <li>-k prevenci klinických příznaků, snížení infekce a vylučování <i>L. kirschneri</i> sérová skupina Grippotyphosa sérovar Grippotyphosa močí</li> <li>-k prevenci mortality, klinických příznaků a infekce způsobené virem vztekliny</li> </ul>	Psi.	<p><b>Jedna dávka přípravku Biocan Novel DHPPi/L4R se podává každé 3 roky.</b></p> <p><b>U parainfluenzy a leptospirových složek se požaduje každoroční revakcinace, proto lze každý rok dle potřeby použít jednu dávku kompatibilní vakcíny Biocan Novel Pi/L4.</b></p>
Biocan Novel R	injekční suspenze	BIOVETA, A.S.	CZ	<p>Aktivní imunizace psů od 12 týdnů věku</p> <p>k prevenci mortality, klinických příznaků a infekce způsobené virem vztekliny.</p>	Psi.	<p><b>Jedna dávka přípravku Biocan Novel R se podává každé 3 roky.</b></p>

Název	Léková forma	Držitel rozhodnutí o registraci	Země držitele	Indikace	Cílový druh	Revakcinace
BIOCAN R	injekční suspenze	BIOVETA, A.S.	CZ	K aktivní imunizaci cílových druhů zvířat proti vzteklině.	Psi, kočky, kožešinová zvířata, skot, koně, ovce, kozy, prasata.	<b>První revakcinace po roce další revakcinace každé 2 roky</b> (nebo v závislosti na lokální legislativě)
BIOFEL PCHR	injekční emulze	BIOVETA, A.S.	CZ	K aktivní imunizaci proti panleukopenii, herpesvirové a calicivirové infekci a vzteklině koček.	Kočky.	<b>Každoroční revakcinace</b>
CANIGEN DHA2PPi/LR	lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem	VIRBAC S.A.	FR	Aktivní imunizace psů proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě, parvoviróze, leptospiróze, vzteklině a respiračním onemocněním způsobených virem parainfluenzy.	Psi.	<b>Každoroční revakcinace</b>
CANVAC DHPPiL+R	lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem	DYNTEC s.r.o.	CZ	K aktivní imunizaci psů proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě, parvoviróze, parainfluenze, třem typům leptospir a vzteklině.	Psi.	<b>Každoroční revakcinace</b>
CANVAC R	injekční suspenze	DYNTEC s.r.o.	CZ	Vakcína je určena k aktivní imunizaci kontinentálních masožravců, sudokopytníků a lichokopytníků proti vzteklině. Jsou to zejména psi, kočky, kožešinová zvířata, skot, ovce, kozy, prasata a koně.	Psi, kočky, kožešinová zvířata, skot, ovce, kozy, prasata a koně.	<b>Každoroční revakcinace</b>

Název	Léková forma	Držitel rozhodnutí o registraci	Země držitele	Indikace	Cílový druh	Revakcinace
EURICAN DAPPi-LR	lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS	FR	Aktivní imunizace psů proti psince, hepatitidě, parvoviróze, laryngotracheitidě, parainfluenze, leptospiróze a vzteklině.	Psi.	<b>Každoroční revakcinace</b>
NOBIVAC RABIES	injekční suspenze	Intervet International B.V.	NL	K aktivní imunizaci zdravých psů, koček, skotu, ovcí, koz, lišek, fretky a koní proti vzteklině.	Psi, kočky, skot, ovce, kozy, lišky, fretky a koně.	<b>Psi kočky: revakcinace každé 3 roky</b> <b>Skot, koně: revakcinace každé 2 roky</b> <b>Fretky, ovce, kozy, lišky: každoroční revakcinace</b> (nebo v závislosti na lokální legislativě)
NOBIVAC RL	injekční suspenze	Intervet International B.V.	NL	Aktivní imunizace psů proti vzteklině a leptospiróze způsobené <i>L. interrogans</i> sérovary <i>canicola</i> a <i>icterohaemorrhagiae</i> .	Psi.	<b>Revakcinovat proti vzteklině vakcínami řady Nobivac lze po třech letech.</b>
PUREVAX Rabies	injekční suspenze	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	DE	Aktivní imunizace koček ve věku 12 týdnů a starších k prevenci mortality způsobené infekcí virem vztekliny.	Kočky.	<b>Revakcinace: 1 rok po primovakcinaci, potom v intervalu až 3 roky.</b>
RABIGEN MONO	injekční suspenze	VIRBAC S.A.	FR	Aktivní imunizace psů a koček proti vzteklině.	Psi a kočky.	<b>Každoroční revakcinace</b>

Název	Léková forma	Držitel rozhodnutí o registraci	Země držitele	Indikace	Cílový druh	Revakcinace
RABISIN	injekční suspenze	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS	FR	Aktivní imunizace zvířat proti vzteklině.	Psi, kočky, fretky, koně, skot, ovce.	<p><b>Psi, kočky: revakcinace 1 rok po primární vakcinaci. Poté v intervalech až 3 roky.</b> (nebo v závislosti na lokální legislativě)</p> <p><b>Fretky, koně, skot, ovce: každoroční revakcinace</b></p>

Název	Léková forma	Držitel rozhodnutí o registraci	Země držitele	Indikace	Cílový druh	Revakcinace
Versican Plus DHPPi/L4R	lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi	Zoetis Belgium SA	BELGIE	<p>Aktivní imunizace psů od 8-9 týdnů věku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-k prevenci mortality a klinických příznaků způsobených virem psinky,</li> <li>-k prevenci mortality a klinických příznaků způsobených psím adenovirem typu 1,</li> <li>-k prevenci klinických příznaků a snížení vylučování psího adenoviru typu 2,</li> <li>-k prevenci mortality a klinických příznaků, leukopenie a snížení vylučování psího parvoviru</li> <li>-k prevenci klinických příznaků (nosní a oční výtok) a snížení vylučování viru psí parainfluenzy,</li> <li>-k prevenci klinických příznaků, infekce a vylučování <i>L. interrogans</i> sérová skupina Australis sérovar Bratislava močí,</li> <li>-k prevenci klinických příznaků, vylučování močí a ke snížení infekce způsobené <i>L. interrogans</i> sérová skupina Canicola sérovar Canicola a <i>L. interrogans</i> sérová skupina Icterohaemorrhagiae sérovar Icterohaemorrhagiae,</li> <li>-k prevenci klinických příznaků a ke snížení infekce a vylučování <i>L. interrogans</i> sérová skupina Grippotyphosa sérovar Grippotyphosa močí a</li> <li>-k prevenci mortality, klinických příznaků a infekce způsobené virem vztekliny.</li> </ul>	Psi.	<p><b>Jedna dávka vakcíny Versican Plus DHPPi/L4R každé 3 roky.</b></p> <p><b>Pro parainfluenzu a <i>Leptospirové</i> složky je nutná revakcinace každý rok. V tomto případě tedy může být podle potřeby použita 1 dávka kompatibilní vakcíny Versican Plus Pi/L4 jednou ročně.</b></p>

Název	Léková forma	Držitel rozhodnutí o registraci	Země držitele	Indikace	Cílový druh	Revakcinace
Versican Plus Pi/L4R	lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi	Zoetis Belgium SA	BELGIE	Aktivní imunizace psů od 8-9 týdne věku: -k prevenci klinických příznaků (nosní a oční výtok) a snížení vylučování viru psí parainfluenzy, -k prevenci klinických příznaků, infekce a vylučování <i>L. interrogans</i> sérová skupina Australis sérovar Bratislava močí, -k prevenci klinických příznaků, vylučování močí a ke snížení infekce způsobené <i>L. interrogans</i> sérová skupina Canicola sérovar Canicola a <i>L. interrogans</i> sérová skupina Icterohaemorrhagiae sérovar Icterohaemorrhagiae, -k prevenci klinických příznaků a ke snížení infekce a vylučování <i>L. interrogans</i> sérová skupina Grippytyphosa sérovar Grippytyphosa močí a -prevence mortality, klinických příznaků a infekce virem vztekliny	Psi.	<b>Jedna dávka vakcíny Versican Plus Pi/L4R každé 3 roky.</b>  <b>Pro parainfluenzu a <i>Leptospirové</i> složky je nutná revakcinace každý rok. V tomto případě tedy může být podle potřeby použita 1 dávka kompatibilní vakcíny Versican Plus Pi/L4 jednou ročně.</b>
Versiguard Rabies	injekční suspenze	Zoetis Česká republika, s.r.o.	CZ	Pro aktivní imunizaci psů, koček, skotu, prasat, ovcí, koz, koní a fretok (12 týdnů a starších) pro prevenci infekce a mortality způsobené virem vztekliny.	Psi, kočky, skot, prasata, ovce, kozy, koně a fretky.	<b>Psi: Jedna dávka Versiguard Rabies každé 3 roky.</b>  <b>Kočky, skot, prasata, ovce, kozy, koně a fretky:</b> <b>Zvířata by měla být revakcinována jednou dávkou vakcíny 1 rok po primární vakcinaci.</b> <b>Po první revakcinaci (podané 1 rok po primární vakcinaci) by měla být zvířata revakcinována každé 2 roky jednou dávkou vakcíny.</b>