

Newcastleská choroba – Pseudomor drůbeže

Co je pseudomor drůbeže?

Virové onemocnění vyvolané aviárním paramyxovirem sérotypu 1 (APMV-1), které se vyskytuje u domácí drůbeže i u volně žijících ptáků. Patří mezi nebezpečné nákazy drůbeže. Její výskyt má pro chovatele drůbeže značný ekonomický dopad. Příbuzným virem AMPV-1 je holubí paramyxovirus (PPMV), který vyvolává onemocnění u holubů.

Způsob přenosu

- přímým kontaktem zdravých ptáků s infikovanými
- nepřímo (kontaminovaným krmivem, vodou, pracovními pomůckami, atd.)

Příznaky nákazy

- trávícími problémy, potíže s dýcháním, nervové příznaky, ztráta produkce, hromadné úhyny

Výskyt APMV a PPMV 2012 – 30. 6. 2018



Zásady pro chovatele drůbeže pro minimalizaci nebezpečí přenosu nákazy do chovu:

- vakcinace drůbeže – povinná v reprodukčních chovech kura domácího a v chovech nosnic produkujících konzumní vejce s více než 500 ks,
- zákaz vstupu nepovolaných osob, dodržování zoohygienických zásad v chovu, uzavřený obrat chovu,
- aktivace dezinfekčních rohoží před vstupy do jednotlivých hal a vjezdů na farmu,
- organizovat chov v uzavřených prostorách, zamezit styku drůbeže s volně žijícím ptactvem (zasítování oken, větracích otvorů),
- u chovů s výběhem zamezit styku drůbeže s volně žijícími ptáky (výstavba zastřešených venkovních voliér, zabránit přístupu volně žijících ptáků ke krmení a napájecí vodě),
- sledovat zdravotní stav,
- hlásit veterinární správě změny zdravotního stavu a zvýšené úhyny.